

دومپریدون

۱ میلی گرم در میلی لیتر

۱۲۰ میلی لیتر سوسپانسیون خوراکی

هر میلی لیتر حاوی:

دومپریدون ۱ میلی گرم

۱۲۰ میلی لیتر

مشخصات دارو:

هر میلی لیتر از سوسپانسیون حاوی ۱ میلی گرم دومپریدون به عنوان ماده موثره است.

کاربرد دارو:

این دارو برای شما تجویز شده است و نباید آن را به دیگران توصیه کنید حتی اگر علائم آن‌ها به علائم شما یکی باشد چرا که ممکن است به آن‌ها آسیب برساند.

دومپریدون با افزایش حرکات و انقباضات معده و روده باعث تخلیه سریعتر دستگاه گوارش می‌شود.

همچنین از دومپریدون برای درمان حالت تهوع و استفراغ استفاده می‌شود.

موارد منع مصرف: (در شرایط زیر از دومپریدون استفاده ننمایید).
• حساسیت نسبت به دومپریدون یا هر یک از مواد جانبی
• ابتلا یا سابقه ابتلا به تومور هیپوفیزی ترشح کننده پرولاکتین (پرولاکتینوما).

• تجویز همزمان با مهارکننده‌های قوی CYP3A4 مانند: کلاریترومایسین، اریترومیسین، ایتراکونازول، کنکونازول، ریتوناویر و وریکونازول.

• در بیماران با اختلال کبدی متوسط یا شدید.
• مصرف این دارو به دلیل ایجاد حرکات گوارشی در مواردی مانند انسداد و خونریزی‌های گوارشی ممنوع است.

موارد هشدار و احتیاط: (این دارو در موارد ذیل با احتیاط مصرف شود)
• مصرف در بیماران بالای ۶۰ سال (افزایش ریسک ایست قلبی).
• مصرف این دارو ممکن است باعث ایجاد خواب آلودگی شود، لذا به بیماران توصیه می‌شود از رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایند.

تداخلات دارویی: (در صورت مصرف داروهای زیر به دلیل امکان تداخل دارویی قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید)
• برخی آنتی بیوتیک‌ها مانند اریترومیسین و کلاریترومایسین
• برخی داروهای ضدقارچ مانند ایتراکونازول، کنکونازول
• داروهای قلبی عروقی و فشار خون

بارداری و شیردهی:

مصرف این دومپریدون در دوران بارداری به اثبات نرسیده است. بنابراین از مصرف دارو در زنان باردار یا افرادی که ممکن است باردار باشند خودداری شود. با توجه به ترشح اندک دارو در شیر مادران، استفاده از این دارو در مادران شیرده تنها با نظر مستقیم پزشک مجاز است.

مقدار و نحوه مصرف:

مصرف در کودکان کمتر از ۱۲ سال با وزن زیر ۳۵ کیلوگرم باید تحت نظارت پزشک صورت گیرد با این حال دوز معمول به

صورت ۲/۵ میلی گرم به ازای هر کیلو وزن بدن ۳ بار در روز است. میزان مصرف در کودکان بالای ۱۲ سال، بزرگسالان و افراد با وزن بالای ۳۵ کیلوگرم: ۱۰ میلی لیتر ۳ بار در روز.

دومپریدون باید ۱۵ تا ۳۰ دقیقه قبل از غذا مصرف شود.

برای درمان حالت تهوع و استفراغ حداکثر مدت درمان نباید بیش از یک هفته باشد. اگر حالت تهوع و استفراغ بیش از یک هفته ادامه داشته باشد، بیمار باید به پزشک مراجعه نماید.

پیش از هر بار مصرف ظرف دارو را تکان دهید.

اگر مصرف دومپریدون را فراموش کردید:

در صورت فراموش کردن مصرف یک نوبت دارو، بلافاصله پس از یادآوری دارو را مصرف نمایید و اگر به مصرف دوز بعدی نزدیک هستید دوز فراموش شده را در نظر نگرفته و طبق برنامه به مصرف دارو ادامه دهید و از ۲ برابر نمودن مصرفی به جهت جبران دوز فراموش شده خودداری نمایید.

مصرف بیش از اندازه:

علائم مصرف بیش از حد ممکن است شامل تحریک پذیری، تغییر هوشیاری، تشنج، گمراهی، خواب آلودگی و عوارض اکستراپیرامیدال است.

عوارض جانبی:

مانند همه داروها، این دارو نیز می‌تواند دارای عوارض جانبی باشد، اگرچه همه این عوارض در فرد مشاهده نمی‌شود:

عوارض شایع شامل سر درد و خشکی دهان است
اگر هرکدام از علائم نادر زیر را مشاهده کردید، باید مصرف خود را متوقف کرده و بلافاصله به پزشک خود اطلاع دهید:
تورم در صورت، لب‌ها، ایجاد بثورات پوستی، مشکل در تنفس (که همگی نشان از حساسیت شما به دارو است)، ایجاد حرکات غیر ارادی در چشم‌ها، تغییر ریتم قلبی (آریتمی)

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید. به جهت محافظت در برابر نور، دارو را در جعبه اصلی نگهداری نمایید. پس از مصرف درب بطری را به خوبی ببندید. دارو را در دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

سایر اطلاعات:

ماده موثره این دارو، دومپریدون است.

مواد دیگر عبارتند از: سوربیتول، گلیسرین، متیل پارابن، پروپیل پارابن، سدیم کربوکسی متیل سلولز، زانتان گام، سوکراوز، پلی سوربات ۲۰، سدیم هیدروکسید

محتویات بسته بندی:

سوسپانسیون خوراکی در شیشه ۱۲۰ میلی لیتری همراه با پیمانه و بروشور در جعبه مقوایی.



www.spdneo.com

دارنده پروانه ساخت: شرکت سینا پیشگام دارو نوین، تهران - ایران
شماره تماس بیمار: ۰۲۱ ۸۸۶۳۰۱۷۵ (داخلی ۱۲۷)

سینا
پیشگام
دارو نوین



Domperidone

1mg/ml

120ml Oral Suspension

Each ml contains:

Domperidone 1mg

120 ml

Description:

Each ml of suspension contains 1 mg Domperidone as an active ingredients.

Drug use:

This medicine has been prescribed for you and you should not recommend it to others, even if their symptoms are the same as yours. This may harm them. Domperidone causes the gastric emptying more quickly by increase the movements or contractions of the stomach and bowel.

Domperidone is also used to treat nausea (feeling sick) and vomiting.

Contraindication: (Domperidone is contraindicated in the following situations)

- Known hypersensitivity to domperidone or any of the excipients.
- Prolactin-releasing pituitary tumor (prolactinoma).
- Co-administration with potent CYP3A4 inhibitors, which have been shown to cause QT interval prolongation such as clarithromycin, erythromycin, itraconazole, oral ketoconazole, ritonavir, and voriconazole.
- In patients with moderate or severe hepatic impairment.
- Whenever stimulation of gastric motility might be dangerous, e.g. in the presence of gastro-intestinal haemorrhage, mechanical obstruction or perforation.

Precautions:

Use with caution in patients aged over 60 years (increased risk of sudden cardiac death).

Domperidone may cause drowsiness or dizziness, don't drive or do any activity that requires alertness or clear vision.

Interaction with other medicines:

If you are taking the following medicines with Domperidone at the same time, you should tell your doctor or pharmacist as Domperidone may interact with them:

- Some antibiotics such as erythromycin and clarithromycin.
- Some antifungal drugs such as itraconazole, ketoconazole.
- Cardiovascular drugs and blood pressure.

Pregnancy and breast-feeding:

It is not known whether the use of domperidone is harmful during pregnancy. If you are pregnant or think you may be you should inform your doctor who will decide if you can take domperidone. Small amounts of domperidone have been detected in breast milk, so domperidone should be used during breast-feeding only if your doctor considers this clearly necessary.

Dosage and administration:

Use in infants and children under 12 years and weighing less than 35kg must be under the supervision of a physician. However, the usual dose is 0.25mg/kg 3 times per day.

Adults and adolescents over 12 years and weighing more than 35kg and children over 35kg: 10ml 3 times per day.

Domperidone should be taken 15-30 minutes before meals.

For the treatment of nausea and vomiting, the maximum duration of treatment should not exceed one week.

Patients should consult their physician if nausea and vomiting persist for more than a week.

Shake the bottle before use.

If you forgot to take Domperidone:

Take the medicine as soon as you can, but skip the missed dose if it is almost time for your next dose. Do not take two doses at one time.

Overdose:

Overdose has been reported primarily in infants and children. Symptoms of overdose may include agitation, altered consciousness, convulsion, disorientation, somnolence and extrapyramidal reactions.

Side effects:

Like all medicines, this medicine can cause side effects although not everybody gets them.

Headache and dry mouth are common side effects of this drug.

If you experience any of the following rare symptoms, you should stop taking the pill and tell your doctor immediately:

Swelling of the face, lips, skin rash, difficulty breathing (all of which indicate that you are allergic to the drug), involuntary movements in the eyes, change in heart rhythm (arrhythmia).

Storage condition:

Store below 30°C and protect from freezing. Keep the bottle in original package in order to protect from light. Keep the bottle tightly closed.

Keep out of the sight and reach of children.

Other information:

The active substance is domperidone.

Other ingredients include sorbitol, glycerin, methyl paraben, propyl paraben, sodium carboxymethylcellulose, xanthan gum, sucralose, polysorbate 20, sodium hydroxide.

Contents of the pack:

Each bottle contains 120ml of suspension with measuring cup and leaflet in a box.



SINA
PISHGAM
DAROU NOVIN

MAH: Sina Pishgam Darou Novin Company - Tehran - Iran

www.spdnc.co

