

Front

قرص جوشان فسفات ساندوز

سدیم اسید فسفات

نام داروی شما، قرص جوشان فسفات ساندوز است

و در این برگه راهنما با نام فسفات ساندوز، شناخته می‌شود.

<p>قبل از شروع مصرف این دارو، تمام این نکات را با دقت بخوانید زیرا حاوی اطلاعات مهمی برای شما است.</p> <p>دارو را دقیقاً همانطور که در این برگه راهنما توضیح داده شده یا همانطور که پزشک یا داروساز به شما گفته است، مصرف کنید.</p> <ul style="list-style-type: none">برگه راهنمای دارو را نزد خود نگه دارید، ممکن است لازم باشد دوباره آن را بخوانید. اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید از داروساز خود بپرسید. در صورت مشاهده هر گونه عارضه جانبی، با پزشک یا داروساز خود صحبت کنید. این شامل هر گونه عارضه جانبی احتمالی است که در این برگه راهنما ذکر نشده است. <p>بخش ۴ را ببینید.</p>
--

آنچه در این برگه راهنما ذکر شده:

- فسفات ساندوز چیست و چه کاربردی دارد
- آنچه باید قبل از مصرف فسفات ساندوز بدانید
- نحوه مصرف فسفات ساندوز
- عوارض جانبی احتمالی
- نحوه نگهداری فسفات ساندوز
- محتویات بسته و سایر اطلاعات

<p>۱. فسفات ساندوز چیست و چه کاربردی دارد</p> <p>فسفات ساندوز حاوی ماده موثره سدیم اسید فسفات است.</p> <p>فسفات ساندوز برای درمان کلسیم بالای خون ناشی از شرایطی مانند شرایط زیر استفاده می‌شود:</p> <ul style="list-style-type: none">پیرکاری غدد پاراتیروئید (هیپیرپاراتیروئیدیسم) سرطان خون (مولتیپل میلوما) و در سایر سرطان‌ها <p>فسفات ساندوز همچنین برای درمان فسفات خون پایین ناشی از بیماری استخوانی که به درمان با ویتامین D پاسخ نمی‌دهد (راشیتیس مقاوم به ویتامین D) و شرایط نرم شدن استخوان (استئومالاسی هیپوفسفاتی مقاوم به ویتامین D)، استفاده می‌شود.</p>
--

<p>۲. آنچه شما باید قبل از مصرف فسفات ساندوز بدانید</p> <p>فسفات ساندوز را در شرایط زیر مصرف نکنید</p> <ul style="list-style-type: none">اگر به سدیم اسید فسفات یا هر یک از ترکیبات دیگر فسفات ساندوز حساسیت دارید (ذکر شده در بخش ۶). واکنش‌های آلرژیک شامل بثورات پوستی، خارش، تنفس دشوار یا تورم صورت، لب‌ها، گلو یا زبان است. <p>موارد هشدار و احتیاط</p> <ul style="list-style-type: none">قبل از مصرف فسفات ساندوز با پزشک یا داروساز خود صحبت کنید. در صورت نیاز به مصرف طولانی مدت این قرص ها، پزشک شما ممکن است سطح فسفات خون شما را تحت نظر داشته باشد. <p>مصرف سایر داروها و فسفات ساندوز</p> <p>اگر داروی دیگری مصرف می کنید، اخیراً مصرف کرده اید یا ممکن است مصرف کنید، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید. به ویژه، داروهای زیر ممکن است با فسفات ساندوز تداخل داشته باشند.</p> <ul style="list-style-type: none">آنتی اسیدها (برای سوء هاضمه و سوزش سر دل). <p>ممکن است همچنان مصرف فسفات ساندوز برای شما خوب باشد. پزشک یا داروساز شما می تواند تصمیم بگیرد که چه چیزی برای شما مناسب است.</p>
--

<p>بارداری و شیردهی</p> <p>اگر باردار هستید یا در دوران شیردهی هستید، فکر می‌کنید ممکن است باردار باشید یا قصد بچه دار شدن دارید، قبل از مصرف این دارو از پزشک یا داروساز خود راهنمایی بخواهید.</p> <p>رانندگی و استفاده از ماشین آلات</p> <p>فسفات ساندوز اثری بر توانایی شما در رانندگی یا استفاده از ماشین آلات ندارد.</p> <p>فسفات ساندوز حاوی:</p> <p>پتاسیم: این دارو حاوی ۱۲۳ میلی‌گرم (۳/۱ میلی‌مول) پتاسیم در هر قرص است. در بیمارانی که عملکرد کلیه آنها کاهش یافته است یا افرادی که دارای رژیم غذایی کنترل شده پتاسیم هستند، مورد توجه قرار گیرد.</p> <p>سدیم: این دارو حاوی ۴۶۹ میلی‌گرم (۲۰/۴ میلی مول) سدیم (جزء اصلی نمک خوراکی) در هر قرص است. این معادل ۲۳ درصد از حداکثر مصرف روزانه توصیه شده سدیم در رژیم غذایی برای یک بزرگسال است. اگر به مصرف یک یا چند قرص به صورت روزانه برای مدت طولانی نیاز دارید با پزشک یا داروساز خود صحبت کنید، به خصوص اگر مشکلات کلیوی مرتبط با کلسیم خون بالا دارید یا رژیم غذایی کنترل شده یا کم نمک (سدیم) به عنوان مثال، برای نارسایی قلبی، فشار خون بالا، یا پره اکلامپسی (فشار خون بالا در دوران بارداری) دارید.</p> <p>ساکارز: اگر پزشک به شما گفته است که نسبت به برخی قندها عدم تحمل دارید، قبل از مصرف این دارو با پزشک خود صحبت کنید.</p>

Back

<p>۳. نحوه مصرف فسفات ساندوز</p> <p>همیشه این دارو را دقیقاً همانطور که در این برگه راهنما توضیح داده شده است یا همانطور که پزشک یا داروساز به شما گفته است مصرف کنید. اگر مطمئن نیستید با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.</p> <p>دوز توصیه شده عبارت است از:</p> <p>بزرگسالن، نوجوانان و کودکان بالای ۵ سال</p> <p>برای کلسیم خون بالا (هیپیرکلسمی): حداکثر ۶ قرص در روز. پزشک دوز شما را تنظیم خواهد کرد.</p>

<p>برای پتاسیم پایین خون به دلیل اختلالات استخوانی مقاوم به ویتامین D: ۴ تا ۶ قرص در روز.</p> <p>کودکان زیر ۵ سال</p> <p>برای کلسیم خون بالا (هیپیرکلسمی): حداکثر ۳ قرص در روز. پزشک دوز را تنظیم خواهد کرد.</p> <p>برای پتاسیم پایین خون به دلیل اختلالات استخوانی مقاوم به ویتامین D: ۲ تا ۳ قرص در روز.</p> <p>فسفات ساندوز باید در ۱/۲ تا ۱/۳ یک لیوان آب (۵۰ تا ۷۰ میلی‌لیتر) حل شده و از راه خوراکی مصرف شود.</p> <p>اگر فسفات ساندوز را بیش از حد لازم مصرف کردید</p> <p>به نزدیک‌ترین مرکز درمانی مراجعه کنید یا بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید. ظرف قرص خود را با خود ببرید.</p> <p>اگر مصرف فسفات ساندوز را فراموش کردید</p> <p>اگر یک نوبت مصرف را فراموش کردید، در اسرع وقت آن را مصرف کنید. اگر چندین نوبت را فراموش کرده‌اید، به پزشک خود بگویید. برای جبران دوز فراموش شده، دو دوز را به صورت همزمان مصرف نکنید.</p> <p>اگر سؤال دیگری در مورد استفاده از این دارو دارید، از پزشک یا داروساز خود بپرسید.</p>
--

<p>۴. عوارض جانبی احتمالی</p> <p>مانند همه داروها، این دارو نیز می‌تواند عوارض جانبی ایجاد کند، اگرچه همه افراد به آن مبتلا نمی‌شوند.</p> <p>همه داروها می‌توانند واکنش‌های آلرژیک ایجاد کنند، اگرچه واکنش‌های آلرژیک جدی بسیار نادر است. اگر دچار هریک از این عوارض شدید فوراً به پزشک خود اطلاع دهید:</p> <ul style="list-style-type: none">هر گونه خس خس ناگهانی مشکل در تنفس تورم پلک‌ها، صورت یا لب‌ها بثورات پوستی یا خارش (مخصوصاً در تمام سطح بدن) <p>عوارض جانبی زیر با این دارو گزارش شده است:</p> <ul style="list-style-type: none">علائم گوارشی مانند حالت تهوع (احساس بیماری) و اسهال

<p>۵. نحوه نگهداری فسفات ساندوز</p> <p>دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری کنید.</p> <p>دارو را پس از تاریخ انقضایی که روی کارتن و تیوب پس از عبارت EXP درج شده است، استفاده نکنید. تاریخ انقضا به آخرین روز آن ماه اشاره دارد.</p> <p>در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. به منظور محافظت در برابر رطوبت در تیوب اصلی نگهداری شود. درپوش تیوب را محکم ببندید.</p> <p>هیچ دارویی را در فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. از داروساز خود بپرسید که چگونه داروهایی را که دیگر استفاده نمی‌کنید دور بریزید. این اقدامات به حفاظت از محیط زیست کمک خواهد کرد.</p>
--

<p>۶. محتویات بسته و سایر اطلاعات</p> <p>محتویات فسفات ساندوز</p> <p>ماده موثره آن سدیم اسید فسفات است.</p> <p>هر قرص حاوی ۱۹۳۶ گرم سدیم اسید فسفات است.</p> <p>مواد جانبی عبارتند از:</p> <p>پتاسیم بی‌کربنات، سدیم بی‌کربنات، سدیم ساخارین، طعم‌دهنده پرتقال TP 52.570، پلی اتیلن گلیکول ۴۰۰۰، پودر قند، اسید سیتریک و آب.</p> <p>خصوصیات ظاهری فسفات ساندوز و محتویات بسته</p> <p>قرص‌ها گرد، سفید و جوشان هستند و تیوب های پلی پروپیلن (پلاستیکی) حاوی ۲۰ قرص جوشان در جعبه‌های ۵ تیوبی (۱۰۰ قرص) عرضه می‌گردند.</p>

<p>Marketing Authorisation Holder</p> <p>ALTURIX Ltd 287 Upper Fourth Street. Milton Keynes, MK9 1EH</p> <p>Manufacturer</p> <p>Elara Pharmservices Limited Iron Farm, 7 Grimesgate Diseworth, Derby DE74 2QD United Kingdom</p>
--

این برگه راهنما در دسامبر ۲۰۲۱ به روز رسانی شده است.