



دارنده بروانه ساخت: شرکت سینا پیشگام دارو نوین | تهران - ایران

www.sinaphishgmdarou.com

مشخصات دارو:

- هر تبویل آلومنیومی ۴۰ گرمی این دارو حاوی ۲٪ کلیندامایسین (به صورت فسفات) و ۲٪ کلوتریمازول به غفار ماده مؤثره می باشد.

سته دارویی:

- آنتی بیوتیک و ضد قارچ

موارد مصرف دارو:

- درمان عفونت های باکتریایی و اذنهن باکتری های هموفیلوس و اژنیت، گاردنلا و اژنیتیس، کریته نایکریکو و اژنیتیس، باکتری های بی هوایی و عفونت های فارجی و اذنهن (اثنی از کاندیدا البیکن و نیز سایر گونه های کاندیدا)

راهنمایی عمومی برای بیمار:

- این دارو برای بیماران فعال شما تجویی شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابهه و یا توصیه ای به دیگران جذب خود را نماید.

- لطفاً پیش از مصرف این دارو برگ راهنمایی به مت طالعه نمایید. همچنین این برگ راهنمای را زند خود نه که دارید چون ممکن است به خواندن مجدد آن نیاز پیدا کنید.

- قیل از مصرف این دارو در موارد زیر با پیشک خود مشورت نمایید:

داشتن سایه حساسیت ای دارو در دیگر

صرف هرگونه داروی دیگر

ایتلاره و شیر دهن

با مردیزه هرگونه بیماری دیگر

اگر نیاز در اعلاءات بیشتری دارید، با پیشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

مورد منع مصرف:

- این دارو را در شرایط زیر مصرف نکنید:

- در صورت داشتن ساقه حساسیت ای دارو، شکوک ای دارو، شکوک ای دارویی (آنول ها)، ایترکوتوناول، شکوک ای دارو و سایر خشندیاری های این دسته دارویی (آنول ها).

- در صورت داشتن ساقه ای ابتلاء به مشکلات کوارشی نظری کولیت ناشی از مصرف آنتی بیوتیک، التهاب منطقه ای روکه، کولیت اولوسراتیو.

- کولیت سونو میزان، (اگرچه در فرم و ایتلار جذب سیستمیک کلیندامایسین کم است و لی ممکن است بیمارانی دچار عارضه ای اسهال بشوند. شروع علائم ممکن است در طول روز یا در شرایط زیر شود):

صرف در بارداری و شیرده:

- بارداری ای دارو از دسته بندی بارداری FDA C قرار دارد. مطالعه مناسب و کنترل شده از مصرف در این دسته کلیندامایسین و کلوتریمازول در سمه اهل اول بارداری وجود ندارد. مطالعات کنترل شده در تعداد محدودی زنان باردار شان می دهد مصرف کلیندامایسین و کلوتریمازول در سمه امه دوم و سوم بارداری عارضه ای در چنین ایجاد نکرده است. مصرف کلیندامایسین و ایتلار در دوران بارداری تنها در صورت ارزیابی و تایید ضرورت نیاز بیمار به دارو توسعه پذشک می شود.

- مصرف در بارداری و شیرده:

- بارداری ای دارو از دسته بندی بارداری FDA B قرار دارد. مطالعه مناسب و کنترل شده از مصرف در این دسته کلیندامایسین و کلوتریمازول در سمه اهل اول بارداری وجود ندارد. مطالعات کنترل شده در تعداد محدودی زنان باردار شان می دهد مصرف کلیندامایسین و کلوتریمازول در سمه امه دوم و سوم بارداری عارضه ای در چنین ایجاد نکرده است. مصرف کلیندامایسین و ایتلار در دوران بارداری تنها در صورت ارزیابی و تایید ضرورت نیاز بیمار به دارو توسعه پذشک می شود.

- شیرده:

- تاکنون مطالعات مناسب و کنترل شده ای از مصرف کلیندامایسین و کلوتریمازول در دوران شیرده می باشد با صلاحیت پذشک شما صورت گیرد و با توجه به تحقیقات پذشک، شیرده یا مصرف دارو قطع کرد.

- هشدارها و احتیاطات مصرف:

- از تاسک کلیندامازول یا چشم ها جذب خود را دریابد آنچه شسته و در صورت تداوم درد چشم ها به پیش از مصرف فراموش کنید.

- پیش از مصرف دارو، روشن صحیح استفاده از دارو به وسیله ایلیکاتور و ایتلار را از قسمت "مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو" این بروشور مطالعه فرمایید.

- طول دوره درمان خود را حقیقی در صورت شروع علائم ممکن است کامل نمایید.

- در صورت فراموش کردن یک ثوابت از مصرف دارو بلاقلائله پس از بیان این دارو نوبت را مصرف نمایید. اما در صورتی که تقریباً زمان نوبت بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف نوبت فراموش شده یا دو برابر کردن نوبت بعدی خود را نمایید.

- در صورت مشاهده عدم بیهویت تا ۳ روز پس از شروع مصرف دارو، عدم رفع کامل علائم بیماری تا ۷ روز پس از شروع درمان، و خدم ترشی شدن علائم بیماری در مصرف دارو، بازگشت مجدد علائم بیماری در همان نوبت ای از دارمان، تاسی با افراد مبتلا به ویروس نقص اینتی کاسبای (HIV) با پیشک خود مشورت نمایید. همچنین چه طبق می باشد از ریشه کن شدن کامل بیماری پس از تداوم دارو درمان، حتماً مجدد با پیشک خود مراجعت نمایید.

- در صورت بروز اسهال با التهاب دارو در طی دوره درمان یا پس از آن، مصرف دارو را فوراً قطع و به پیشک مراجعت نمایید.

* کلیه اصول بهداشتی را رعایت فرمایید؛ به علت وجود ترشحات از بد بهداشتی استفاده نموده و از استفاده از تامpon خودداری نمایید. چه چلوكیگری از عفونت مجدد از لباس نموده و از استفاده از مایکرولیستیک چارک کلیندامایسین اثر مهارنگende سیستم عصبی- عضلانی مانند بوتاکس خودداری نمایید چراکه کلیندامایسین اثر مهارنگende سیستم عصبی- عضلانی داشته و از استفاده هفتمان آن با این دسته داروها می تواند موج تشید این اثر شود.

* ایلیکاتور و ایتلار در زنان باردار (۶ ماه به بالا) می بایست با اختیار مصرف شود. دارو را پس از سبزی شدن تاریخ انقضایه که بر روی جعبه آن نوشته شده است، مصرف نکنید.

* مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

- مقدار مصرف هر دارو را پیشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

- دوز معمول در بالغین: یک ایلیکاتور پر از کرم داخل و ایزن یکبار در روز به مدت ۲-۷ روز متوالی در نوزان غیر باردار و یک ایلیکاتور پر از کرم داخل و ایزن یکبار در روز به مدت ۷ روز در نوزان باردار استعمال شود.

- در خصوص نخویه صحیح مصرف دارو به کاتکات زیر نوچه فرمایید:

- کرم کلیندامازول را به طور معمول شب هنگام خواب استفاده نمایید مگر اینکه به روش دیگر توسعه پذشک شما تجویی شده باشد.

- دست ها را قبیل و بعد از مصرف کلیندامازول بشویید.

(۱) تقویت کرم را از جمعه بیرون ببرید و با پشت درب آن در پوش آلومنیومی را سوراخ نمایید. ایلیکاتور را با فشار روی مهانه تقویت کرم را فشار دهد. با یک دست ایلیکاتور را داشته و با دست دیگر تقویت کرم را فشار داده تا لوبل ایلیکاتور پر از کرم شده و میله ایلیکاتور را انتها به عقب ببرگرد. ایلیکاتور را از تقویت کرم جدا کنید و در پیویت را بیندید.

(۲) به شدت خوبی، زانوها را از این باز و خن مخدوه و کفت یا هاما را روی زمین قرار دهید و ایلیکاتور را از کرم را تا آنچه ممکن است داخل و ایزن فرو برد و سپس میله را را شدار داده تا کرم کاملاً در عمق و ایزن تخلیه گرد.

(۳) پس از مصرف ایلیکاتور را دور بیندید.

- عوارض جانبی دارو:

- هر دارو به موازای اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برجسته عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض ممکن است در یک فرد دیده شود، در صورت بروز عوارض زیر یا عوارض غیر از آنچه در برگ راهنمای فرمایید است، با پیشک.

- داروساز یا مراکز درمانی ممکن است مسکلات کوارشی از جمله اسهال، تهوع یا عوارض پیشتر شایع باشند.

- عوارض مکث شایع: سردرد، سرگیجه، مشکلات کوارشی از جمله اسهال، تهوع یا استقرانه درد را با این اضطراب ممدد.

- عوارض نادر: حساسیت (سوژه پوست، خارش، قرمی، راش پوستی، التهاب، کهربا و یا در علامت دیگر از تحریک پوستی که قبل از درمان وجود نداشته است.)

- عوارض غیر از تداوم نیاز به مراقبت پذشک دارند:

- عوارض مکث شایع یا نادر: درد را سوزش درالت نتایس شریک چنسی مسمویت:

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پیشک و یا مراکز درمانی مراجعت نمایید.

- بسته بندی دارو:

- کلیندامازول در قیوب آلومنیومی حاوی ۴ گرم کرم و ایتلار کلیندامایسین-کلوتریمازول ۷ به همراه ۲۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- کلیندامازول در قیوب آلومنیومی حاوی ۴ گرم کرم و ایتلار کلیندامایسین-کلوتریمازول ۷ به همراه ۲۰ درجه سانتیگراد درون جعبه به همراه برگ راهنمای فرمایید.

- References:

1.United States Pharmacopie Drug Information (2007 Edition)

2.BNF (68th Edition)

Vaginal Cream

Clindamazol®

Clindamycin 2% / Clotrimazole 2%



SINA
PISHGAM
DAROU NOVIN

MAH:
Sina Pishgam Darou Novin Co. | Tehran-Iran
www.sinapishgandarou.com

Clindamzol 2%-2% is for vaginal use. Each aluminum tube contains 40 grams clindamycin (as phosphate) 2% - clotrimazole 2% w/w as active ingredients.

- **Category:** antibiotic and antifungal.

- **Indications:**

Bacterial vaginosis treatment (previously known as Haemophilus vaginitis, Gardnerella vaginitis, Coryne bacterium vaginitis, or anaerobic vaginosis.) Vulvovaginal Candidiasis treatment caused by Candida albicans or other species of Candida.

Guidance for proper use:

This medicine has been prescribed for you personally and you should not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.

- Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine.

Keep this leaflet. You may need to read it again.

- Before you take this drug consult your doctor if:

- Hypersensitivity to this drug or any other drugs.
- Using any other medications
- Having any other medical conditions.
- Pregnancy and breast-feeding.

- If you have further questions, please ask your doctor or pharmacist.

- **Contraindications:**

Do not use this drug in case of following conditions:

- Hypersensitivity to clindamycin, lincomycin, clotrimazole, itraconazole, fluconazole and other drugs in azoles category.
- Gastrointestinal disorders including:
history of antibiotic associated colitis, regional enteritis, ulcerative colitis.
- Pseudomembranous colitis (although there is minimal systemic absorption of vaginal clindamycin from the vagina, it is important to consider pseudomembranous colitis if patient presents with diarrhea, onset of symptoms may occur during or after antimicrobial treatment.)

- **Pregnancy and Breast-feeding:**

- **Pregnancy:**

FDA Pregnancy Category B; adequate and well-controlled studies in human have not been done during the first trimester. Well-controlled clinical trials on up to 177 pregnant females using vaginal clindamycin and clotrimazole during the second and third trimesters showed no adverse effects in the fetus. Vaginal clindamycin-clotrimazole should be used during pregnancy only if your physician decides it is clearly needed.

- **Breast-feeding:**

It is not known if vaginally administered clindamycin-clotrimazole is distributed into breast milk. A decision should be made whether to discontinue nursing or to discontinue the drug, taking into account the importance of the drug to the mother.

- **Warning and precautions:**

- Avoid getting medication into your eyes; if medication does get into your eyes, wash your eyes out immediately with large amounts of cool tap water; check with your physician if your eyes continue to be painful.
- To know how to use applicator properly, read "Dosage and administration" section in this leaflet carefully before use.
- Continue medicine for full time of treatment, even if menstruation begins.
- Insert missed dose as soon as possible; Do not insert if it is almost time for next dose.
- Check with physician if no improvement within 3 days, if symptoms do not disappear within 7 days, if symptoms worsen during use, if symptoms return within 2 months or if exposure to human immunodeficiency virus (HIV) occurs.
- Follow-up visit to physician after treatment for bacterial vaginosis to ensure that infection has been properly treated.
- Discontinue immediately and contact with your physician if diarrhea or colitis develops.
- Use protecting clothing because of possible soiling with vaginal clotrimazole and clindamycin, avoid the use of un-medicated tampons, use hygienic measures to cure infection and prevent reinfection, wear cotton panties, wear only freshly washed underclothes, sexual abstinence is recommended during treatment to prevent reinfection. Avoid use of latex products such

as condoms, diaphragms and cervical caps during treatment and for 3 days after discontinuing medication.

- Caution if dizziness occurs.

- Clindamycin should not be used with neuromuscular blocking agent, ex: botox. Clindamycin has been shown to have neuromuscular blocking properties that may enhance action of other neuromuscular blocking agents.
- Vaginal applicators should be used with caution after the sixth month of pregnancy.

- Do not use the medicine after the expiry date stated on the carton.

- **Dosing and administration:**

The exact amount of medicine should be prescribed by your doctor. However usual dosing is mentioned as follow:

- **Usual adult dose:**

one applicator into vagina once a day for three or seven consecutive days in non-pregnant females and one applicator into vagina once a day for seven consecutive days in pregnant females.

Read below instruction to know how to use the drug properly:

Use the drug at bedtime, unless otherwise directed by your physician.

Wash your hands immediately before and after vaginal administration.

- 1) Remove the cap from the tube, open the tube with cap bottom, attach the applicator in its place and screw it tight. Squeeze the tube from the bottom to fill the cream into the cylinder and push out the plunger as far out till the cylinder is filled. Remove the filled applicator from the tube and close the tube with the cap.
- 2) Lie on the back with the knees bent and spread out. Hold the filled applicator by the cylinder and gently insert the applicator into the vagina as deeply as possible. Press the plunger completely to empty the contents of the applicator. With the plunger still depressed, remove the applicator from the vagina holding it by the cylinder.
- 3) Throw the applicator away in the trash after each use.

- **Side/Adverse effects:**

Like all medicines, Clindamazol® may have side effects. If you notice any side effects not mentioned in this leaflet, or if any of the side effects become serious, please inform your doctor or pharmacist immediately.

Those indicating below need for medical attention:

- **Incidence more frequent:** Itching of the vagina or genital area; pain during sexual intercourse; thick, white vaginal discharge with no odor or with a mild odor not present before therapy.

- **Incidence less frequent:**

Headache, dizziness, gastrointestinal disturbances (diarrhea, nausea or vomiting, stomach pain or cramps)

- **Incidence rare:** Hypersensitivity (burning, itching, redness, skin rash, swelling, hives or other signs of skin irritation not present before the therapy.)

Those indicating need for medical attention only if they continue or are bothersome:

- **Incidence less frequent or rare:** burning or irritation of penis of sexual partner.

- **Overdosage:**

In case of intake of an accidental or voluntary overdose, inform your doctor immediately.

- **Storage:**

Store below 30°C. Protect from light, moisture and freezing. Keep out of the reach of children.

- **Packaging:**

Clindamazol® is supplied in aluminum tubes, each containing 40 gr clindamycin (as phosphate) 2%- clotrimazole 2%.

One tube and 7 applicators with a leaflet are packed in one cardboard box.

- **References:**

1. United State Pharmacopedia Drug Information (2007 Edition)

2. BNF (68th Edition)