

size

150 x 120 (mm)

# سانيول

فوليك اسيد + يد

دارنده پروانه ساخت: شركت سيناپيشگام دارو نوين، تهران | ايران

اگر طلاني مدت داروهای ضد درد مصرف میکنید، اگر شما در حال مصرف داروهای ضد درد شنجه هدایاتنونی هستید، اگر داروهای کارابازپین، استرورژنا، ضد بارداری های خوارگی، فنوبیتان، پرمیدن، کلتسبیرامین، متواترنس، پرمیاترن، تریاتمترن، تری متپپرونی مصرف می کنید: مصرف همچنان این داروها با فولیک اسید، باعث کاهش اثر این داروها یا کاهش اثر فولیک اسید می شود.

اگر داروهای آنتی اسید حاوی الومینیوم با نیزیم اند AIMSGS مصرف می کنید: مصرف همچنان این داروها با فولیک اسید، موجب کاهش جذب فولیک اسید می شود. لذا مصرف این داروهای آنتی اسیدها در حال مصرف آنتی بیوتیک اسید می شود.

اگر شما مکمل های حاوی زینک مصرف می کنید.

**عوارض جانبی اختلال:** اندان سایر داروها با فولیک اسید و بد

در تواند عوارض جانبی ایجاد کند هر چند که به حال هیچ کدام از این عوارض مشاهده شده است، در صورت مشاهده این عوارض با پزشک خود مشورت نمایید.

واکنش های حساسیتی، حضوضا تنگی نفس، گرفتگی و خس خس

فراورده هایی که حاوی فولیک اسید هستند، خودداری نمایید.

صراف این مکمل در بیماران تبروئیدی حتما زیر نظر پزشک صورت کشد.

**مسمومیت:** در صورت مصرف انفاقی بیش از مقدار توصیه شده

سریعا به پزشک و با مرکز درمانی مراجعه نمایید.

**شرابی تکهداری:** در مای کمتر از ۳ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت در بسته بندی اصلی تکهداری نمایید.

**بسته بندی فراورده:** این مکمل در جعبه های ۳۰ عددی به همراه

برگ، اضمناً عرضه میگردد.

Reference:  
United State Pharmacopoeia Drug Information (2007 Edition).  
BNF 64

نام ژنریک: فولیک اسید / ید

مشخصات فراورده: هر قرص حاوی ۵۰۰ میکروگرم اسید فولیک و ۱۵۰ میکروگرم ید به عنوان ماده مؤثره می باشد.

دسته دارویی: مکمل تغذیه ای

راهنمای عمومی مصرف: این فراورده مکمل تغذیه ای بوده وجهت مصرف در دوران نیاز از بارداری، حین بارداری و شیر دهن توصیه می شود.

**قبل از مصرف این فراورده با پزشک خود مشورت کنید:**

۱. اگر مبتلا به بیماری تبروئید هستید.

۲. در صورت ابتلاء به بیماری هرگونه حساسیت

۳. در صورت ابتلاء به بیماری کمبود و بتایمین B12

۴. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

**موارد مصرف:** مصرف اسید فولیک خطر بروز نقص لوله های عصبی را کاهش می کند.

ید را در شد گرد و نکامل بینایی و شنوایی و رشد جین، شیرخوار ضروری است.

**موارد منع مصرف:** از مصرف قرص اسید فولیک و بد همراه با سایر فراورده هایی که حاوی فولیک اسید هستند، خودداری نمایید.

صراف این مکمل در بیماران تبروئیدی حتما زیر نظر پزشک صورت کشد.

**صرف در بارداری و شیردهی:** با توجه به اینکه این مکمل در دوران

بیش از بارداری، بارداری و دوران شیردهی مورد استفاده قرار می کشد و لای توصیه می شود قبل از مصرف آن حتما با پزشک و یا داروساز خود مشورت کنید.

**مقادیر و نحوه صحیح مصرف فراورده:** طبق از افزایش مقدار توصیه شده برای مصرف، خودداری نمایید

مقدار این مصرف این مکمل، روزانه یک عدد می باشد.

قرص اسید فولیک و بد را همراه خدا و آب کافی مصرف نمایید.

**این فراورده حاوی مواد جانبی:** میکروگرگستانین سلولون، کورون استارچ، کاراس کارملوز سدیم، دی کلسیم هیدروکسون فسفات، بدمیم بیکربنات، کلیندال سایکیتون دی اکسید، نیزیم استاترات، هیدروکسی پروپیول متنبل سلولون، پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰، تالک، تیانیتم دی اکسید، زک قرمز

اگر به این مواد حساسیت دارید، قبل از مصرف این فراورده با پزشک خود مشورت کنید.

**نداخالت دارویی:** صرف این دارو ممکن است با داروهای تراخاخ داشته باشد لذا بیش از مصرف این فراورده پزشک خود را از تمامی اقلام داروهایی که مصرف میباشد، یا به تازگی مصرف کرده اید یا

قصد دارید مصرف نمایید آگاه سازید:

# SUNIWELL

## Folic Acid + Iodine

MAH: Sina Pishgam Darou Novin Co. | Tehran - Iran

**Generic name:** Folic acid / Iodine

**Description:** Each tablet contains 500 µg Folic acid and 150 µg Iodide as active Ingredients.

**Category:** Dietary Supplement

**Guidance for proper use:** This product is dietary supplement and is recommended for use in preconception, pregnancy and breast feeding.

**Before you take this drug consult your physician if:**

1. You are suffering from thyroid disease.
2. You have any hypersensitivity.
3. You have pernicious anemia (low blood concentration of vitamin B12).
4. If you have further questions, please ask your physician or pharmacist.

**Indications:** Folic acid usage before conception and during early pregnancy may reduce the risk of neural tube defect.

Iodine is essential for brain, vision and hearing development of fetus and infants.

**Contraindications:** Do not use with other folic acid containing supplements.

Consult your doctor before use if suffering from a thyroid disease.

**Pregnancy and breast-feeding:** Although this supplement is suitable for preconception, pregnancy and breast feeding, it is recommended to consult your doctor before use.

**How to take Folic acid /Iodine tablet:**

-Please don't increase the recommended amount for use

The daily allowance of this supplement is one tablet.

-Take this supplement with meal and sufficient water.

**Inactive ingredients of tablet:** Microcrystalline cellulose, Corn starch, Crosscarmellose sodium, Dicalcium hydrogen phosphate, Sodium bicarbonate, Colloidal Silicone dioxide, Magnesium stearate, Hydroxypropyl methylcellulose, Polyethylene glycol 6000, Talc, Titanium dioxide, Red iron oxide

If you have hypersensitivity to any of these ingredients, contact your doctor before taking this supplement.

**Drug interactions:** This drug may interact with following drugs. Inform your physician about all your medicines you are taking or have recently taken or planning to take, before using this product:

- Long term use of analgesics, hydantoin anticonvulsants, carbamazepine, estrogens, oral contraceptives, phenobarbital, primidone, cholestyramine, methotrexate, pyrimethamine, triamterene, trimethoprim: concurrent use with folic acid may decrease the effect of these drugs or reduce the effect of folic acid.
- Aluminum or magnesium containing antacids: take antacids at least 2 hours after folic acid.
- Antibiotics
- Sulfonamides, including sulfasalazine.
- Zinc supplements.

**Possible Side effect:** Like all medicines, Folic Acid / Iodine tablets may have side effects, although not everybody gets them. Inform your physician if you notice any of the following side effects:

Allergic reaction, specifically: shortness of breath; troubled breathing, tightness of chest, wheezing, reddened skin, fever, general weakness or discomfort, skin rash or itching, gastrointestinal disturbances.

**Over-dosage:** In case of intake of an accidental or voluntary overdose, inform your physician immediately.

**Storage:** Store below 30°C. Keep in original package and protect from light and moisture

**Packaging:** This supplement is supplied in one cardboard box, with leaflet and each box contains 30 tablets.

### References:

- United State Pharmacopoeia Drug Information (2007 Edition)
- BNF 64



**SINA  
PISHGAM  
DAROU NOVIN**

[www.sinapishgandarou.com](http://www.sinapishgandarou.com)

Customers Contact number: +98 21 88630175