

۱/۵ میلی‌گرم
قرص پیوسته رهش

اینداپامید

اینداپامید یک داروی ضد فشارخون است که به دسته‌ای از داروها به نام «دیورتیک‌ها» تعلق دارد.



نحوه مصرف:

دوز معمول یک قرص در روز ترجیحاً صبح‌ها می‌باشد. (برای جلوگیری از اثرات بیداری شبانه دیورتیک‌ها) قرص‌ها باید با آب بلعیده شوند و از جویدن آن‌ها خودداری شود.

اثرات جانبی احتمالی:

مانند تمام داروها اینداپامید می‌تواند موجب اثرات جانبی شود. تهوع، یبوست، خشکی دهان، سرگیجه، خستگی، گزگز اندام و سردرد ممکن است به‌ندرت روی دهد.

بارداری و شیردهی:

مانند تمام دیورتیک‌ها، از مصرف این دارو در زنان باردار باید اجتناب شود. شیردهی در هنگام درمان با این دارو توصیه نمی‌شود زیرا ماده اصلی در شیر ترشح می‌شود.

توصیه‌ها:

این دارو حاوی لاکتوز هست. در افرادی که عدم تحمل لاکتوز دارند، احتیاط شود.

در ورزشکاران با احتیاط مصرف شود. این محصول دارویی حاوی یک ماده فعال است که ممکن است منجر به مثبت شدن نتایج آزمایش‌هایی شود که در زمینه‌ی کنترل دوپینگ صورت می‌گیرد.



نماینده انحصاری در ایران:

سینا
پیشگام
دارونوین



www.sinapishgamdarou.com

تلفن: ۰۲۱ ۸۸۳۳۷۶۹۸

تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان چهارم، پلاک ۲۸، ساختمان سینا