

۲,۴,۲ بارداری و شیردهی:

بارداری: هورمون‌های تیروئیدی به میزان کم به داخل جفت نفوذ می‌کنند. انتقال آن‌ها به جنین از طریق جفت بسیار آهسته است و اهمیت آن به‌طور دقیق تعیین نشده است. تجربیات بالینی در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری هیچ‌گونه عوارض جانبی بر جنین را نشان نمی‌دهد.

درمان جایگزینی با داروهای تیروئیدی باید در دوران بارداری ادامه یابد و اگر در دوران بارداری هیپوتیروئیدسم تشخیص داده شد، شروع درمان ضروری است.

تشخیص باید بر پایه‌ی اندازه‌گیری سطح تیروئوپین (به دلیل کاهش غلظت تیروکسین سرم در زنان باردار) سرم صورت گیرد.

در دوران بارداری، نیاز به درمان جایگزینی تیروئیدی افزایش می‌یابد و ممکن است نیاز باشد تا دوز افزایش یابد.

شیردهی: مقادیر حداقلی از هورمون داخل شیر مادر ترشح می‌شود. با این‌وجود تجویز هورمون‌های تیروئید در مادران شیرده باید با احتیاط شدید صورت گیرد.

۳,۴,۲ تأثیر بر توانایی در رانندگی و کار با ماشین‌آلات: ندارد.

۵,۲ تداخل‌های دارویی:

(۱) لیوتیروئین باعث افزایش اثر ضداسفردگی‌های سه حلقه‌ای و ضد انعقادهای کومارینی می‌شود.

(۲) کلستیرامین جذب لیوتیروئین را کاهش می‌دهد.

۶,۲ میزان دوز:

برای شروع در کم‌کاری تیروئید ۱۰ میکروگرم در روز .

۷,۲ مصرف بیش‌ازحد دارو:

مصرف بیش‌ازحد T3[®] می‌تواند باعث ایجاد علائم و نشانه‌های هایپرتریوئیدسم مانند تاکی‌کاردی، لرز، عرق کردن، ضربان نامنظم قلب، لاغری و غیره می‌شود.

تمام این علائم می‌تواند با کاهش دوز یا گذشت زمان فروکش کنند.

در موارد شدید مصرف بیش‌ازحد دارو، درمان حمایتی توصیه می‌شود.

۸,۲ آنچه باید در موارد فراموشی مصرف یک دوز دارو بدانید:

اگر مصرف یک دوز دارو را فراموش کرده‌اید، باید در اسرع وقت آن را مصرف کنید. با این‌حال اگر زمان مصرف دوز بعدی دارو نزدیک است، بهتر است مصرف دوز فراموش شده را رها کنید.

از دو برابر کردن دوز مصرفی خودداری کنید.

۹,۲ عوارض جانبی: هنگامی که از دوز لازم بیشتر مصرف کردید:

(۱) تاکی‌کاردی (۲) ضربان نامنظم قلب (۳) تحریک‌پذیری (۴) ضعف عضلاتی (۵) لرز (۶) کاهش وزن.

اگر هر کدام از عوارض جانبی شدید شد و یا هر عارضه جانبی که در این برگه راهنما ذکر نشده را مشاهده کردید، لطفاً به داروساز یا پزشک خود اطلاع دهید.

۱۰,۲ تاریخ انقضا: روی بسته‌بندی داخلی و خارجی محصول درج شده است. اگر تاریخ منقضی شده است، دارو را مصرف نکنید.

۱۱,۲ شرایط نگهداری: این دارو باید در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. دارو را از نور و رطوبت محافظت کنید. همچنین باید در بسته‌بندی اصلی و

همانند سایر داروها دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.

۱۲,۲ تاریخ آخرین بازمینی: ۲۲ ژوئن ۲۰۱۶

۳. اطلاعات راجع به نحوه صحیح مصرف دارو

- این دارو را پزشک تنها برای مشکل پزشکی خاص شما تجویز کرده است. این دارو را به دیگران ندهید یا بدون مشاوره قبلی با پزشک آن را در بیماری دیگری استفاده نکنید.
- اگر به هرگونه عارضه جانبی مبتلا شدید به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.
- اگر راجع به دارویی که مصرف می‌کنید هرگونه سؤالی دارید یا درباره مشکل پزشکی‌تان به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، بدون درنگ از پزشک یا داروساز خود راهنمایی بخواهید.
- برای اثربخشی و ایمنی دارو، باید آن را طبق اطلاعات ضمیمه شده در جعبه مصرف کنید.
- به‌منظور ایمنی و سلامتی شما، لازم است که هر اطلاعاتی درباره داروی تجویز شده را با دقت مطالعه فرمایید.
- دارو را در کابینت حمام نگهداری نکنید، زیرا گرما و رطوبت می‌تواند دارو را خراب کند و برای سلامتی شما مضر شود.
- داروهایی که استفاده نمی‌کنید یا داروهایی که منقضی شده‌اند را نگه ندارید.
- تمام داروها را دور از دسترس کودکان نگاهدارید.

۴. طبقه‌بندی عمومی برای عرضه

این محصول دارویی با تجویز پزشک قابل عرضه است.



UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A.

14th km National Road 1, GR-145 64 Kifissia, Greece,

Tel.: +30 2108072512, Fax: +30 2108078907, e-mail: unipharma@uni-pharma.gr, www.uni-pharma.gr

نمایندگی در ایران: سینا پیشگام دارو نوین www.sinapishgamdarou.com

برگه راهنمای بیمار**لیوتیروئین سدیم****۲۵ میکروگرم****قرص خوراکی**

تی ۳

۱. جزئیات محصول دارویی

نام: T3[®]

۱, ۲ ترکیب: ماده مؤثره: لیوتیروئین سدیم.

مواد جانبی: لاکتوز، سدیم استارچ گلیکولات، استارات منیزیم، تالک سیلیسی **.

**مشکل از لاکتوز مونوهایدرات، ژل‌لین، نشاسته ذرت .

**مشکل از تالک خالص شده، سیلیکون دی‌اکسید کلونیدی .

رنگ‌ها:

رنگ زرد T3[®] Egg yellow lake art 74675 (Lake Sunset Yellow E 110, Lake Quinoline Yellow E 104)

۳,۱ شکل دارویی: قرص.

۴,۱ میزان ماده مؤثره: هر قرص T3[®]-حاوی ۲۵ میکروگرم لیوتیروئین سدیم است.

۵,۱ بسته‌بندی ارائه‌شده:

(۱) جعبه مقوایی حاوی ۳۰ قرص که در ۳ ورقه‌ی ۱۰ عددی از جنس PVC، PVDC و فویل آلومینیومی بسته‌بندی شده و همچنین حاوی یک برگه راهنمای بیمار است.

(۲) جعبه مقوایی حاوی ۳۰ قرص که در ۲ ورقه‌ی ۱۵ عددی از جنس PVC، PVDC و فویل آلومینیومی بسته‌بندی شده و همچنین حاوی یک برگه راهنمای بیمار است.

۶,۱ گروه درمانی: ترکیب تیروئیدی.

۷,۱ دارنده مجوز بازاریابی و فروش:

UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A., 14th km National Road 1, GR-145 64 Kifissia, Greece, Tel.:+30 2108072512, Fax: +30 2108078907, E-mail: unipharma@uni-pharma.gr.

۱,۸ کارخانه سازنده:

UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A., 14th km National Road 1, GR-145 64 Kifissia, Greece, Tel.: +30 2108072512, Fax: +30 2108078907, E-mail: unipharma@uni-pharma.gr

۲. آنچه باید راجع به این محصول دارویی بدانید**۱,۲ اطلاعات عمومی:**

T3[®] حاوی ماده مؤثره صنایع لیوتیروئین (ال-تری یدو تیروئین، هورمون غده تیروئید) است که به‌صورت میکرو کریستال نمک سدیم تولید شده است.

با توجه به شکل بلوری خالص شیمیایی، فعالیت T3[®] بدون تغییر باقی می‌ماند و در مقایسه با سایر فرمولاسیون‌ها که حاوی عصاره تیروئید حیوانی هستند میزان دوز را می‌توان به‌دستی تعیین کرد.

عمل فیزیولوژیکی و فارماکولوژیکی این دارو با عمل ال-تری یدو تیروئین غده تیروئید کاملاً یکسان است.

۲,۲ موارد مصرف:

(۱) درمان جایگزینی در کم‌کاری تیروئید.

(۲) گواتر غیرسمی.

(۳) التهاب تیروئید خود ایمنی.

(۴) سرطانات تیروئید.

(۵) کم‌ای میکس ادما.

(۶) تست مهار عملکرد تیروئید.

۳,۲ موارد منع مصرف: -انفارکتوس میوکارد اخیر. -نارسایی غده فوق کلیوی درمان‌نشده.

۴,۲ هشدارهای ویژه و احتیاط‌های خاص برای مصرف:

۱,۴,۲ عمومی:

(۱) در موارد کم‌کاری شدید تیروئید.

(۲) در صورت وجود بیماری هم‌زمان قلبی عروقی یا دیابت، درمان با دوزهای کوچک شروع شده و به‌تدریج با افزایش دوزها ادامه می‌یابد.

(۳) در هیپوتیروئیدسم هیپوفیزی، برای جلوگیری از مشکلات ناشی از نارسایی فوق کلیوی تجویز گلوکوکورتیکوئیدها باید مقدم باشد.

(۴) تجویز دوزهای بالاتر ترکیبات تیروئید در چاقی، به‌ویژه هنگامی که با تجویز هم‌زمان آمین‌های سمپاتومیمتیک (داروهای آتورکتیک) همراه می‌شوند به توجه بسیار ویژه‌ای نیاز دارند.

(۵) به‌طور کلی هرگونه مصرف بیش‌ازحد دارو می‌تواند به علائم تیروئیتیکوز منجر شود.

بحران تیروئیکسی نیازمند درمان اضطراری، تجویز وریدی مایعات، پروپرانولول (۱۲ میلی‌گرم تزریق وریدی آهسته) و هیدروکورتیزون (۱۰۰ میلی‌گرم هر ۶ ساعت) و

همچنین محلول پد از طریق دهان (لوگول ۳۰ قطره در روز) است.

تجویز هم‌زمان داروهای ضد تیروئید (ترجیحاً پروپیل تیواوراسیل) در دوزهای بالا (تا ۱۰۰۰ میلی‌گرم روزانه) انجام می‌شود و همچنین از طریق لوله نازوگاستریک نیز قابل انجام است (لوین).