

Risperidone


محلول خوراکی بدون قند ریسپریدون (1mg/ml)

محصول کشور ایرلند



تلفن: ۰۲۱ ۸۸۳۳۷۶۹۸ فکس: ۰۲۱ ۸۸۶۳۰۱۷۸
تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان چهارم، پلاک ۳۴، واحد ۱
info@sinapishgamdarou.com www.sinapishgamdarou.com





Risperidone

Sugar Free Oral Solution 1mg/ml

محلول خوراکی بدون قند ریسپریدون (1mg/ml)

محلول خوراکی بدون قند ریسپریدون به گروهی از داروها بنام **ضد روان پریشی** تعلق دارد.

محلول خوراکی ریسپریدون در درمان موارد زیر بکار می رود:

- اسکیزوفرنی، که در آن ممکن است چیزهایی دیده شنیده یا احساس شود که وجود ندارند، باور داشتن به چیزهای نادرست، احساس غیر عادی شک و سرگشتگی.
- مانیا که در آن فرد احساس هیجان زدگی مفرط، سرخوشی و تحریک پذیری دارد.
- درمان کوتاه مدت پرخاشگری در مبتلایان به آلزایمر (زوال عقل) که به خود و دیگران آسیب می رسانند.
- درمان کوتاه مدت پرخاشگری در کودکان مبتلا به ناتوانی ذهنی (حداقل ۵ سال) و نوجوانان مبتلا به اختلال رفتاری.

تداخلات:

دارو های زیر ممکن است تاثیر ریسپریدون را کاهش دهد:

- ریفامپین
- کاربامازپین، فنی توئین
- فنوباریتال

داروهای زیر ممکن است تاثیر ریسپریدون را افزایش دهد:

- کینیدین
- ضد افسردگی ها مانند پاروکستین، فلوکستین،
- ضدافسردگی های سه حلقه ای
- داروهای که به نام بتا بلاکرها شناخته می شوند.
- فنوتیازین
- سایمتیدین، رانیتیدین
- ایتراکونازول و کتوکونازول
- داروهای درمان ایدز مانند ریتوناویر
- وراپامیل
- سرترالین و فلووکسامین

عوارض جانبی:

- پارکینسون: این بیماری ممکن است شامل: اختلال یا کندی در تحرک، احساس کوفتگی یا سفتی عضلات (که منجر به حرکات نامنظم می شود) و حتی گاهی اوقات احساس قفل کردن حرکات و بعد دوباره حرکت کردن. دیگر علایم پارکینسون شامل گام های کوتاه و آهسته، لرزش در وضعیت استراحت، افزایش بزاق دهان و یا سرازیر شدنش، و یا از دست دادن حالت چهره.
- احساس خواب آلودگی یا هوشیاری پایین.
- سردرد.

بارداری، شیردهی و باروری:

طبقه بندی مصرف در بارداری: رده C
به علت محدود بودن اطلاعات در دوران شیردهی بهتر است مصرف نشود.
محلول خوراکی ریسپریدون ممکن است سطوح هورمونی به نام پرولاکتین را افزایش دهد که روی ناباروری اثر می گذارد.

درمان اسکیزوفرنی

بزرگسالان

- دوز معمول برای شروع روزانه ۲ میلی گرم است که ممکن است در روز بعد تا روزانه ۴ میلی گرم افزایش یابد.
- دوز دارو بعدا با توجه به واکنش به درمان ممکن است تعدیل شود.
- اکثر بیماران با دوز ۴ تا ۶ میلی گرم در روز احساس بهتری دارند.
- دوز مجموع روزانه را می توان به یک یا دو قسمت در روز تقسیم کرد.

سالمدان

- دوز معمول برای شروع ۰/۵ میلی گرم دوبار در روز خواهد بود.
- ممکن است بعدا دوز دارو تدریجا به ۱ تا ۲ میلی گرم دوبار در روز افزایش یابد.

کودکان و نوجوانان

- کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال مبتلا به اسکیزوفرنی نباید با محلول خوراکی ریسپریدون درمان شوند.

درمان مانیا

بزرگسالان

- دوز معمول برای شروع ۲ میلی گرم یکبار در روز است.
- دوز دارو بعدا با توجه به واکنش به درمان ممکن است تدریجا تعدیل شود.
- اکثر بیماران با دوز ۱ تا ۶ میلی گرم یکبار در روز احساس بهتری دارند.

سالمدان

- دوز معمول برای شروع ۰/۵ میلی گرم دوبار در روز خواهد بود.
- ممکن است بعدا با توجه به واکنش به درمان دوز دارو تدریجا تا ۱ الی ۲ میلی گرم دوبار در روز تعدیل شود.

کودکان و نوجوانان

- کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال مبتلا به مانیا نباید با محلول خوراکی ریسپریدون درمان شوند.

برای درمان پرخاشگری طولانی مدت در مبتلایان به آلزایمر

سالمدان

- دوز معمول برای شروع ۰/۲۵ میلی گرم دوبار در روز خواهد بود.
- بعدا با توجه به واکنش به درمان دوز دارو تعدیل خواهد شد.
- اکثر بیماران با دوز ۰/۵ میلی گرم دو بار در روز احساس بهتری دارند. برخی از بیماران ممکن است به ۱ میلی گرم دوبار در روز نیاز داشته باشند.
- طول دوره درمان در مبتلایان به آلزایمر نباید بیش از ۶ هفته باشد.

برای درمان اختلال رفتاری

دوز دارو به وزن کودک بستگی دارد.

برای کودکانی که کمتر از ۵۰ کیلوگرم وزن دارند:

- دوز معمول برای شروع ۰/۲۵ میلی گرم یکبار در روز خواهد بود.
- مقدار دوز ممکن است تدریجا در روز های بعد ۰/۲۵ میلی گرم در هر روز افزایش یابد.
- دوز معمول نگهدارنده ۰/۲۵ تا ۰/۷۵ میلی گرم یکبار در روز است.

برای کودکانی که وزنشان ۵۰ کیلوگرم یا بیشتر است:

- دوز معمول برای شروع ۰/۵ میلی گرم یکبار در روز خواهد بود.
- مقدار دوز ممکن است تدریجا در روزهای بعد ۰/۵ میلی گرم در هر روز افزایش یابد.
- دوز معمول نگهدارنده ۰/۵ تا ۱/۵ میلی گرم یکبار در روز است.
- طول دوره درمان در مبتلایان به اختلال رفتاری نباید بیش از ۶ هفته باشد.
- کودکان زیر ۵ سال نباید با محلول خوراکی ریسپریدون درمان شوند.

مبتلایان به مشکلات کبدی یا کلیوی

صرف نظر از بیماری که باید درمان شود، تمام دوزهای شروع و دوز های ریسپریدون ذکر شده باید نصف شوند. افزایش دوز در این بیماران باید آهسته تر باشد. ریسپریدون در این گروه بیمارها باید با احتیاط مصرف گردد.