

کامبیستیل/ COMBISTILL

توبرامایسین^{۰.۳%} / دگزامتاژون^{۰.۱%}
آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزیدی / کورتیکواستروئید (دگزامتاژون)



مناسب طیف وسیعی از باکتری های عامل عفونت چشمی

موارد مصرف:

- التهاب های چشمی

درمان التهاب های پاسخگو به استرتوئید ملتحمه بولبار و پلبرال، قرنیه و قدام کره چشم، زمانی که یک عفونت باکتریایی سطحی، یا ریسک ابتلا به آن وجود داشته باشد.

- یووئیت مزمن (التهاب مزمن عنبیه، جسم مژگانی و مشیمیه)
- صدمات وارد شده به قرنیه (ناشی از عوامل شیمیایی، اشعه یا حرارت)
- ورود جسم خارجی

موارد مصرف در بارداری و شیردهی:

صرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

دوز مصرف:

- بالغین: یک الی دو قطره هر ۴-۶ ساعت در چشم آسیب دیده بچکانید. در ۲۴-۴۸ ساعت اول ممکن است دوز مصرفی تا ۱-۲ قطره در هر ۲ ساعت افزایش یابد.
- اطفال بالای ۲ سال و نوجوانان: مطابق دوز بالغین

موارد منع مصرف:

عفونت قارچی یا ویروسی در چشم یا پلک مانند هرپس.

عوارض جانبی:

قرمزی چشم التهاب و تورم پلک ها درد چشم.



توجه:

در صورتیکه بیمار از لنزهای نرم استفاده می کند، برای استفاده از قطره ابتدا لنزها را بیرون آورده، ۱۵ دقیقه پس از ریختن قطره در چشم صبر کند و بعد دوباره لنزها را در چشم بگذارد.

هشدار ها:

از تماس نوک قطره با چشم بپرهیزید دوره درمان را کامل کنید از استفاده طولانی مدت یا مکرر آن بپرهیزید.



محصول کمپانی ایتالیایی:
BRUSCHETTINI

نماینده در ایران: شرکت سینا پیشگام دارو نوین
آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، تقاطع اتوبار شهید گمنام،
تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۳۰۱۷۵-۶
خیابان چهارم، پلاک ۲۸

سینا
پیشگام
دارو نوین