

هر قرص حاوی ۷۵۰ میلی گرم متوکاربامول به عنوان ماده موثره است.

متوکاربامول به گروهی از داروها موسوم به شل کننده های عضلانی تعلق دارد.

این دارو برای شما تجویز شده است و نباید آن را به دیگران توصیه کنید حتی اگر علائم آنها با علائم شما یکی باشد. این کار ممکن است به آنها آسیب برساند. متوکاربامول برای درمان کوتاه مدت درد و اسپاسم عضلانی ناشی از آسیب هایی مانند پیچ خوردگی و کشیدگی و درمان علامتی کوتاه مدت اسپاسم عضلانی دردناک مرتبط با شرایط اسکلتی عضلانی استفاده می شود.

در شرایط زیر از متوکاربامول استفاده ننمایید:
اگر به متوکاربامول حساسیت دارید یا در گذشته هنگام مصرف از داروهای حاوی متوکاربامول دچار مشکل شده اید.
اگر به سایر مواد تشکیل دهنده این دارو آلرژی دارند (در بخش ۱۲ ذکر شده است)
اگر دچار عارضه مغزی شده اید یا سابقه کما دارید.
اگر مبتلا به صرع یا تشنج هستید.
اگر مبتلا به بیماری ضعف عضلانی (میاستنی گراویس) هستید.

قبل از مصرف متوکاربامول موارد زیر را به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید:
ابتلا یا سابقه ابتلا به هر گونه مشکل کلیوی یا کبدی
چنانچه قرار است هرگونه تست یا آزمایشی انجام دهید که متوکاربامول می تواند در نتایج تداخل ایجاد کند قبل از انجام آزمایش به پزشک خود بگویید که متوکاربامول مصرف می کنید.
متوکاربامول ممکن است سبب خواب آلودگی شود لذا حین درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.

اگر از داروهای زیر استفاده می کنید، باید به پزشک یا داروساز خود بگویید زیرا متوکاربامول ممکن است با آنها تداخل داشته باشد:
-باربیتورات ها که می توانند برای صرع یا کمک به خواب مصرف شود.
-سهاگرنده های اشتها برای کمک به کاهش وزن.
-داروهای که برای ناراحتی های معده مصرف می شوند.
-داروهای اعصاب و روان که برای درمان اضطراب، افسردگی یا سایر بیماری های روحی مصرف می شوند.
اگر به دلیل قصد مصرف داروهای بی حس کننده دارید، به پزشک یا دندانپزشک خود بگویید که در حال مصرف متوکاربامول هستید.
-هنگام مصرف متوکاربامول از نوشیدن الکل خودداری کنید.

این دارو از نظر رده بندی مصرف در بارداری در دسته C قرار دارد، این به آن معناست که مطالعات کافی و کنترل شده در زمینه مصرف این دارو در دوران بارداری انجام نشده است لذا مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی باید با تجویز پزشک صورت گیرد.

همیشه این دارو را دقیقاً همانطور که پزشک یا داروساز تجویز کرده اند مصرف کنید. در صورت عدم اطمینان با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

بزرگسالان: ۱۵۰۰ میلی گرم، ۴ بار در روز مصرف نمایند. گاهی اوقات دوز کمتر ممکن است کافی باشد. شما باید دوزها را تا حد ممکن به طور مساوی در یک دوره ۲۴ ساعته مصرف نمایید.

سالمندان: بیماران مسن ممکن است تنها به ۷۵۰-۵۰۰ میلی گرم ۴ بار در روز برای تسکین درد و اسپاسم عضلات نیاز داشته باشند.

کودکان: این قرص ها نباید به کودکان زیر ۱۲ سال داده شود. اختلالات کبدی، در صورت ابتلا به بیماری های کبدی، ممکن است به فاصله بیشتری بین مصرف قرص نیاز داشته باشید. همیشه باید دستورالعمل های پزشک خود را به دقت دنبال کنید.

اگر مصرف متوکاربامول را فراموش کردید:
دوز فراموش شده را هنگامی که به یاد می آورید مصرف کنید. همیشه حداقل فاصله ۴ ساعته را در مصرف دوز بعدی رعایت نمایید. از ۲ برابر نمودن دوز مصرفی به جهت جبران دوز فراموش شده خودداری نمایید. این قرص ها برای درمان کوتاه مدت هستند. آنها را برای مدتی که پزشک توصیه کرده است یا تا زمانی که دیگر برای تسکین درد به آنها نیازی ندارید مصرف کنید.

علائم مصرف بیش از حد متوکاربامول تنها در صورت مصرف همزمان با الکل یا سایر داروهای ضد افسردگی مرکزی رخ می دهد. گزارش شده است که متوکاربامول اثرات ضد اشتها و آنتی موسکارینی را تقویت می کند.

مانند همه داروها، این دارو نیز می تواند عوارض جانبی ایجاد کند، اگرچه همه افراد به این عوارض دچار نمی شوند.
اگر هرکدام از علائم نادر زیر را مشاهده کردید، باید مصرف قرص خود را متوقف کرده و بلافاصله به پزشک خود اطلاع دهید:
-گیجی، تشنج، جوش، بثورات یا تورم صورت یا گردن و تنگی نفس که ممکن است نشانه آلرژی باشد.
در صورت مشاهده هر یک از این علائم، باید با پزشک خود تماس بگیرید: -زرد شدن پوست و / یا سفیدی چشم
-سطح گلول های سفید خون شما نیز ممکن است کاهش یابد که می تواند منجر به عود عفونت ها و یا زخم های دهانی گردد.
اگر هر یک از عوارض جانبی زیر آزار دهنده باشد، باید به پزشک خود اطلاع دهید:

خواب آلودگی، دشواری در خواب، بی قراری، اضطراب یا نگرانی، از دست دادن حافظه، تاری دید یا دوبینی، حرکات سریع یا غیرمعمول چشم، قرمزی چشم همراه با گرفتگی بینی، احساس تهوع یا استفراغ، سوزش معده، اختلال در چشایی، لرزش یا رعشه، ناهماهنگی عضلانی خفیف، سردرد، تب، خارش، ضریان قلب آهسته، گرگرفتگی، غش یا احساس ضعف، فشار خون پایین

در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد به دور از نور و رطوبت نگهداری شود. دور از دسترسی اطفال نگه دارید.

ماده موثره این دارو، متوکاربامول است.
سایر اجزای فرآورده: پودین ۳۰۰، میکروکریستالین سلولز، سدیم لوریل سولفات، سدیم استارچ گلیکولات، تالک، منیزیم استارات

- بطری ۳۰ عددی در جعبه مقوایی
- ۳ پلیستر هرکدام حاوی ۱۰ عدد قرص در جعبه مقوایی
- ۱۰ پلیستر هرکدام حاوی ۱۰ عدد قرص در جعبه مقوایی



Metocarsin[®] Methocarbamol 750

Generic Name: Methocarbamol

1.Description:

Each Tablet contains 750 mg of Methocarbamol as the active ingredient.

2.Category:

Methocarbamol belongs to a group of medicines called muscle relaxants (musculoskeletal relaxants).

3.Guidance for proper use:

This medicine has been prescribed for you personally and you should not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.

Methocarbamol is used for the short-term treatment of pain and muscle spasm caused by injuries such as sprains and strains and short-term symptomatic treatment of painful muscle spasm associated with musculoskeletal conditions.

4.Contraindication:

Do not use Methocarbamol if you:

- are allergic to Methocarbamol, or have had any problems in the past with medicines containing Methocarbamol.
- are allergic to any of the other ingredients of this medicine (listed in section 12)
- have ever suffered any brain damage or coma
- suffer from epilepsy or convulsions
- suffer from muscle weakness (a disease called myasthenia gravis)

5.Warning and precaution:

Tell your doctor or pharmacist before taking Methocarbamol if you:

- have, or have had, any kidney or liver problems
- have any medical investigations or tests that Methocarbamol could interfere with the results. Tell your doctor that you are taking Methocarbamol before you have the test.
- Methocarbamol may make you feel sleepy. Do not drive or operate machinery until you are sure you are not affected.

6.Drug interaction:

If you are taking any of the following medicines, you should tell your doctor or pharmacist as Methocarbamol may interact with them:

- Barbiturates which can be taken for epilepsy or to help you sleep.
- Appetite suppressants to help you lose weight.
- Medicines for stomach upsets.
- Psychotropic drugs for the treatment of anxiety, depression or other mental illnesses.
- If you are due to have anaesthetic for any reason, tell your doctor or dentist that you are taking Methocarbamol.
- You should avoid drinking alcohol while taking Methocarbamol.

7.Pregnancy & Breast feeding:

Pregnancy category C, it means that adequate and well-controlled studies in human have not been done. Methocarbamol should be used during pregnancy and breastfeeding only with a doctor's prescription.

8.Dosage & administration:

Always take this medicine exactly as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Adults: Take 1500 mg, 4 times a day. Sometimes a lower dose may be sufficient. You should spread the doses as evenly as possible over a 24-hour period.

Elderly: older patients may only need 500-750 mg, 4 times a day to give the same relief from the pain and muscle spasm.

Children: These tablets should not be given to children under 12 years old.

If you forget to take Methocarbamol:

Take your normal dose when you remember. Always leave at least 4 hours before taking any more tablets. DO NOT TAKE A DOUBLE DOSE OF TABLETS TO MAKE UP FOR A MISSED DOSE.

Liver impairment: you may need a longer interval between taking the tablets if you have liver disease. You should always follow your doctor's instructions carefully.

These tablets are for short-term treatment. Take them for as long as your doctor has recommended, or until you no longer need them to ease the pain.

9.Over dosage:

Overdose of Methocarbamol is frequently in conjunction with alcohol or other CNS depressants. Methocarbamol has also been reported to potentiate the effects of anorectics and antimuscarinics.

10.Side effects:

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

If you notice any of the following rare symptoms, you should STOP taking your tablets and tell your doctor immediately:

-confusion, convulsions, fits, and rash or swelling of the face or neck and shortness of breath which may be a sign of an allergy.

If you notice any of these symptoms, you should contact your doctor:

-yellowing of the skin and/or whites of the eyes.

The levels of your white blood cells may also be reduced which can lead to recurrent infections and mouth ulcers

If any of the following side effects are troublesome, you should tell your doctor:

difficulty in sleeping, restlessness, anxiety or worry, dizziness, memory loss, blurred or double vision, rapid or unusual eye movements, reddening of the eyes together with nasal stuffiness, feeling sick or vomiting, heartburn, taste disturbance, tremor or shakiness, mild muscle incoordination, headache, fever, itching, a slow heartbeat, flushing, fainting or feeling faint, low blood pressure

11.Storage:

Store below 30°C. Protect from light and moisture. Keep out of the reach of children.

12.Other information

Active substance is Methocarbamol

The other ingredients are: povidone k30, microcrystalline cellulose, sodium lauryl sulfate, sodium starch glycolate, talc, magnesium stearate

13.Packaging:

- Bottle of 30 tablets in box.
- 3 blister (each blister contains 10 F.C tablets)
- 10 blister (each blister contains 10 F.C tablets) in box.

Marketing Authorization Holder: Sina Pishgam Darou Novin Co
Tehran - Iran



SINA
PISHGAM
DAROU NOVIN

MAH: Sina Pishgam Darou Novin Company
Tehran - Iran

www.spdnc.com

