

### 1. Description:

Each Clindamazol® aluminum tube contains 40 grams clindamycin (as phosphate) 2% - clotrimazole 2% w/w as active ingredients.

### 2. Category:

antibiotic and antifungal.

### 3. Guidance for proper use:

**This medicine has been prescribed for you personally and you should not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.**

-Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine.

-Keep this leaflet. You may need to read it again.

-Before you take this drug consult your doctor if:

- Hypersensitivity to this drug or any other drugs.

- Using any other medications

- Having any other medical conditions.

- Pregnancy and breast-feeding.

- If you have further questions, please ask your doctor or pharmacist.

### 4. Indications:

Bacterial vaginosis treatment (previously known as Haemophilus vaginitis, Gardnerella vaginitis, Coryne bacterium vaginitis, or anaerobic vaginosis) Vulvovaginal Candidiasis treatment caused by Candida albicans or other species of Candida.

### 5. Contraindications:

Do not use this drug in case of following conditions:

- Hypersensitivity to clindamycin, lincomycin, clotrimazole, itraconazole, Fluconazole and other drugs in azoles category.

- Gastrointestinal disorders including history of antibiotic associated colitis, regional enteritis, ulcerative colitis. - Pseudomembranous colitis (although there is minimal systemic absorption of vaginal clindamycin from the vagina, it is important to consider pseudomembranous colitis if patient presents with diarrhea, onset of symptoms may occur during or after antimicrobial treatment.)

### 6. Pregnancy and Breast-feeding:

**-Pregnancy:** FDA Pregnancy Category B: adequate and well-controlled studies in human have not been done during the first trimester. Vaginal clindamycin-clotrimazole should be used during pregnancy only if your physician decides it is clearly needed.

**-Breast-feeding:** A decision should be made whether to discontinue nursing or to discontinue the drug, taking into account the importance of the drug to the mother.

### 7. Warning and precautions:

- Avoid getting medication into your eyes; if medication does get into your eyes, wash your eyes out immediately with large amounts of cool tap water; check with your physician if your eyes continue to be painful.

- To know how to use applicator properly, read "Dosing and administration" section in this leaflet carefully before use.

- Continue medicine for full time of treatment, even if menstruation begins.

- Insert missed dose as soon as possible: Do not insert if it is almost time for next dose.

- Check with physician if no improvement within 3 days, if symptoms do not disappear within 7 days, if symptoms worsen during use, if symptoms return within 2 months or if exposure to human immunodeficiency virus (HIV) occurs.

- Follow-up visit to physician after treatment for bacterial vaginosis to ensure that infection has been properly treated.

- Discontinue immediately and contact with your physician if diarrhea or colitis develops.

- Use protecting clothing because of possible soiling with vaginal clotrimazole and clindamycin, avoid the use of un-medicated tampons, use hygienic measures to cure infection and prevent

reinfection, wear cotton panties, wear only freshly washed underclothes, sexual abstinence is recommended during treatment to prevent reinfection. Avoid use of latex products such as condoms, diaphragms and cervical caps during treatment and for 3 days after discontinuing medication.

-Clindamycin should not be used with neuromuscular blocking agent, ex: butox. Clindamycin has been shown to have neuromuscular blocking properties that may enhance action of other neuromuscular blocking agents.

-Vaginal applicators should be used with caution after the sixth month of pregnancy.

-This medicine contains 10 mg of benzyl alcohol in each gram. Benzyl alcohol may cause mild local irritation.

### 8. Dosing and Dosing and administration:

The exact amount of medicine should be prescribed by your doctor. However usual dosing is mentioned as follow:

**•Usual adult dose:** one applicator into vagina once a day for three or seven consecutive days in non-pregnant females and one applicator into vagina once a day for seven consecutive days in pregnant females.

### Read below instruction to know how to use the drug properly:

Use the drug at bedtime, unless otherwise directed by your physician. Wash your hands immediately before and after vaginal administration.

1) Remove the cap from the tube, open the tube with cap bottom

2) Attach the applicator in its place and screw it tight. Squeeze the tube from the bottom to fill the cream into the cylinder and push out the plunger as far out till the cylinder is filled. Remove the filled applicator from the tube and close the tube with the cap.

3) Lie on the back with the knees bent and spread out. Hold the filled applicator by the cylinder and gently insert the applicator into the vagina as deeply as possible. Press the plunger completely to empty the contents of the applicator. With the plunger still depressed, remove the applicator from the vagina holding it by the cylinder.

4) Throw the applicator away in the trash after each use.

The number of applicators required to complete the course of treatment should be purchased separately from the pharmacy.

### 9. Side/Adverse effects:

Like all medicines, Clindamazol® may have side effects. If you notice any side effects not mentioned in this leaflet, or if any of the side effects become serious, please inform your doctor or pharmacist immediately.

### Those indicating below need for medical attention:

**-Incidence more frequent:** Itching of the vagina or genital area; pain during sexual intercourse; thick white vaginal discharge with no odor or with a mild odor not present before therapy.

**-Incidence less frequent:** Headache, dizziness, gastrointestinal disturbances (diarrhea, nausea or vomiting, stomach pain or cramps)

**-Incidence rare:** Hypersensitivity (burning, itching, redness, skin rash, swelling, hives or other signs of skin irritation not present before the therapy)

### Those indicating need for medical attention only if they continue or are bothersome:

**-Incidence less frequent or rare:** burning or irritation of penis of sexual partner.

### 10. Overdosage:

In case of intake of an accidental or voluntary overdose, inform your doctor immediately.

### 11. Storage:

Store below 30°C. Protect from light, moisture and freezing. Keep out of the reach of children.

### 12. Packaging:

Clindamazol® is supplied in 40 g aluminum tubes with applicator with leaflet in one box.

### References:

1.United State Pharmacopia Drug Information (2007 Edition)

2.BNF (68th Edition)

-کلیه اصول بهداشتی را رعایت فرماید؛ به علت وجود ترشحات از ده بهداشتی استفاده نموده و از استفاده از تابلوخودداری نمایید. جهت لغوگیری از عفونت مجدد از لباس زیر تمیز و نجی استفاده نمایید. در طول دوره درمان از مقاومت اختناق ورزید. توصیه می شود در طول دوره درمان و تا ۳ روز پس از اتمام درمان از وسائل جلوگیری کننده از جنس لاتکس نظیر کاندوم، دیافراگم و کلاهک دهانه رحم استفاده نکنید.

-از مصرف هم زمان این دارو با دروغاهی مهار کننده سیستم حصی عضلانی مانند بوتولینومیک خودداری نمایید. جراحت کلینیداماپسین اثر مهار کننده سیستم حصی عضلانی داشته و لذا استفاده هم زمان آن با این دسته دروها می تواند موجب تنشی دین این اثر شود. اپلیکاتور و ازینال در زمان باردار (۹ ماه به بالا) می بایست با احتیاط مصرف شود.

این دارو حاوی ۱۰ میلی گرم بنزیل الكل در هر گرم است  
بنزیل الكل ممکن است باعث تحریک موضعی حفیق شود.

**۸. مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:**  
مقدار مصرف هر دارو را پیش از معمول اما مقدار مصرف معمول

دارو به شرح ذیل است: دوز معمول در بالغین: یک اپلیکاتور پر از کرم داخل واژن یکبار در روز به مدت ۳-۷ روز متواتی در زمان غیر باردار و یک اپلیکاتور پر از کرم داخل واژن یکبار در روز به مدت ۷ روز در زمان باردار مصرف شود.

در **عوارض نحوه صحیح مصرف دارو به نکات زیر توجه فرماید**  
کرم کلینیداماژول را به طور معمول شب هنگام خواب استفاده نمایید مگر اینکه به روش دیگر توسط پیشک شما تجویز شده باشد.  
دستها را قل و بعد از مصرف کلینیداماژول بشویید.

(۱) تیوب کرم را از جعبه بیرون بیاورید و با پیش درب آن دریوش آلومینیومی را سروخ نمایید.

(۲) اپلیکاتور را با فشار روی دهانه تیوب قرار دهدی. با یک دست اپلیکاتور را نگه داشته و با دست دیگر تیوب کرم را فشار داده تا لوله اپلیکاتور پر از کرم شده و میله اپلیکاتور تا انتهای به عقب برگرد. اپلیکاتور را از تیوب جدا کنید و در تیوب را بیند.

(۳) به پیش درب از هم باز و خم نموده و کف پاها را روی زمین قرار دهید و اپلیکاتور پر از کرم را تا آنجا که ممکن است داخل واژن فرو بده و سپس میله را فشار داده تا کرم کاملا در عمق واژن تخلیه گردد.

**۴) اپلیکاتور یکبار مصرف می باشد:** پس از مصرف دور انداخته شود و به تعداد مور نیاز در اroxane خردیار شود.

**۹. عوارض جانبی:** هر دارو به مواد اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اکرچه همه این عوارض ممکن است در یک فرد دیگر نشود، در صورت بروز عوارض زیر و یا عوارض غیر از آنچه در برگ راهنمای قید گردیده است، با پیشک، داروساز و یا مارکز درمانی تماس بگیرید:

**عوارض که نیاز به مراقبت پیشک دارند:** عوارض با شیوع بیشتر: خارش و واژن یا ناحیه ژنیات، مقاومت دردنک، ترشحات زیاد، بدnon بو یا مم بو و سعیدگرگ واژن که قبل از درمان وجود نداشته است.

**عوارض با شیوع کمتر: سردرد، سرگیجه، مشکلات گوارشی از جمله اسهال،** تهوع یا اسید خوار، درد یا اضطرابات معده

**عوارض نادر: حساسیت (سوژش بوسست، خارش، قزمیز، راش پوستی،** التهاب، کهربا و یا هر علامت دیگر از تحریک پوستی که قبل از درمان وجود نداشته است)

**عوارضی که کمتر در صورت تداوم نیاز به مراقبت پیشک دارند:** عوارضی که شیوع کم و یا نادر در یا سورژش درالت ناسانی شریک جنسی

**۱۰. مصرف پیش از انداده:** در صورت مصرف اتفاقی پیش از مقدار توصیه شده سریعا به پیشک و یا مارکز درمانی مراجعه نمایید.

**۱۱. اشراب نگهداری دارو:** در مایک مکتر از ۳۰ درجه سانتینیگارد، دور از نور و رطوبت نگهداری و از بخ زدگی محافظت نمایید. دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

**۱۲. محتوایان پسته ندی:** کرم واژینال کلینیداماژول در تیوب آلومینیومی ۴۰ گرمی به همراه اپلیکاتور دون جعبه و برگ راهنمای عرضه می گردد.

**References:**  
1. United State Pharmacopedia Drug Information (2007 Edition)  
2. BNF (68th Edition)

**۱. مشخصات دارو:**  
هر تیوب آلومینیومی ۴۰ گرمی کرم کلینیداماژول<sup>®</sup> این دارو حاوی ۰/۳٪ کلینیداماپسین (به صورت فسفات) و ۰/۲٪ کلوتریماژول به عنوان ماده مؤثره است.

**۲. دسته دارویی:**

آنتی بیوتیک و ضد قارچ

**۳. راهنمای عمومی برای بیمار:**

این دارو برای بیماریهای شما تعویز شده است، لذا از مصرف آن در مواد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جدا خودداری نمایید.

برگ راهنمای را نزد خود نگه دارید چون ممکن است به خواندن مجدد آن نیاز پیدا نماید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پیشک خود مشورت نمایید:  
داشتن ساقه های باکتریایی و اژن (شامل باکتری های هموفیلوس واژینت).

**۴. موارد منع مصرف دارو:**

درومان عفونت های باکتریایی و اژن (شامل باکتری های هموفیلوس واژینت، گاردنلا واژینتیس، کوئینه باکتریوم واژینتیس، باکتری های بی هوایی) و عفونت های قارچی و اژن (ناشی از کاندیدا آلبیکن و نیز سایر گونه های کاندیدا)

**۵. موارد منع مصرف:**

این دارو را در شرایط زیر مصرف ننکنید:  
در صورت داشتن سابقه حساسیت به کلینیداماپسین، لینکومایپسین، کلوتریماژول، اپنکوتانازول، فلوکوتانازول و سایر ضد قارچ دارویی دیگر

**۶. مصرف در بارداری و شیردهی:**

درومان عفونت های باکتریایی و اژن (شامل باکتری های هموفیلوس واژینت، گاردنلا واژینتیس، کوئینه باکتریوم واژینتیس، باکتری های بی هوایی) و عفونت های قارچی و اژن (ناشی از کاندیدا آلبیکن و نیز سایر گونه های کاندیدا)

**۷. مصرف در بارداری و شیردهی:**

این دارو را در شرایط زیر مصرف ننکنید:  
در صورت داشتن منطقه ای روده، کویلیت اولسراپتوی، کویلیت سود و میبران (اگرچه در فرم واژینال جذب سیستمیک کلینیداماپسین کم است ولی ممکن است میبرانی درگار عارضه اسهال بشوند. شروع علائم ممکن است در طول مصرف دارو یا پس از آن ظاهر شود).

**۸. مصرف در بارداری و شیردهی:**

این دارو را در شرایط زیر مصرف ننکنید:  
مناسب و کنترل شده از مصرف واژینال کلینیداماپسین و کلوتریماژول در سه ماهه اول بارداری وجود ندارد. مصرف کلینیداماپسین واژینال در درمان بارداری تنهای ته در صورت ازیزی و تایید ضرورت نیاز بیمار به دارو توسط پیشک می تواند مورت گیرد.

**۹. شیردهی:** مصرف این دارو در دوران شیردهی می باشد و می تواند میبرانی در طول مصرف دارو یا پس از آن ظاهر شود).

**۱۰. هشدارها و اختیارات مصرف:**

از ته در کلینیداماژول<sup>®</sup> با چشم ها جدا خودداری فرمایید. در صورت تماس اتفاقی این، چشم خود را با مقدار زیادی آب خنک شسته و در صورت تداوم درد چشم های پیشک خود مراجعه نمایید.

**۱۱. پیش از قسمت:** مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو<sup>®</sup> مطالعه کنید و پیشک شما صورت گیرد و با توجه به تشخیص پیشک، شیردهی و یا مصرف دارو قطع گردد.

**۱۲. هشدارها و اختیارات مصرف:**

از تماس کلینیداماژول<sup>®</sup> با چشم ها جدا خودداری فرمایید. در صورت تماس اتفاقی این، چشم خود را با مقدار زیادی آب خنک شسته و در صورت تداوم درد چشم های پیشک خود مراجعه نمایید.

**۱۳. پیش از قسمت:** مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو<sup>®</sup> مطالعه کنید و پیشک شما صورت گیرد و با توجه به تشخیص پیشک، شیردهی و یا مصرف دارو قطع گردد.

**۱۴. در صورت مشاهده عدم بهبودی تا ۳ روز پس از شروع مصرف دارو، عدم رفع کامل علائم بیماری تا ۷ روز پس از شروع درمان، و خیم تر شدن علائم بیماری دو ماه پس از درمان، تهای افراد مبتلا به ویروس نقص اینمی اکتسابی (HIV) با پیشک خود مشورت نمایید.**

**۱۵. جهت اطمینان از ریشه کن شدن کامل بیماری پس از اتمام دوره درمان،** حتما بارگشت مجدد از ته در صورت تداوم نیاز به مراجعة نمایید.

**۱۶. در صورت بروز اسهال با التهاب روده در طی دوره درمان یا پس از آن،** مصرف دارو را فورا قطع و به پیشک مراجعة نمایید.